

持ち込み診断へのご協力のお願い

カンキツグリーニング病のまん延を防ぐために

沖縄県ではカンキツグリーニング病への感染の有無を無料で診断する、持ち込み診断を実施しています。

カンキツグリーニング病とは？

世界的に重要なかんきつの病害。**感染**すると数年後に**枯れてしまう**。

病気の広まり方 | ミカンキジラミという虫、病気の木からの取り木・接ぎ木

病気の治療方法 | **ない**。病気の木は感染源となるので速やかに伐採処分する。

ミカンキジラミ

成虫



2mm



幼虫



カンキツグリーニング病の症状

下の図のように、木の一部の枝が枯れていたり、右の図のような特徴のある葉が見られます。



主脈の黄化



まだら退緑



脈間黄化



黄化

持ち込みの方法

4方向から症状のある葉を含む枝を1本ずつ採取し、袋にいれる。
木が複数本ある場合は、どの木から取ったものなのかわかるように、目印などをつける。
持ち込みはお住まいの市町村役場や下記の機関にお願いします。




ゴマダラカミキリの被害について

ゴマダラカミキリもカンキツグリーンング病と同様の症状を引き起こします。サンプル採取の際は、以下のような被害がないかも確認してください。

成虫



幼虫



成虫の脱出孔



樹皮の食害痕



カミキリムシ対策

- ①脱出孔に専用殺虫剤をまいた後、肥料等をまき、樹勢を高める。
- ②4月までに株元から高さ60cmまで、ネット等を巻く(産卵防止)

持ち込み診断の依頼やお問い合わせは下記にお願いします。

- ①市町村役場農林水産担当課・最寄りのJA営農振興センター
- ②農業改良普及センター 中部: 098-894-6521 南部: 098-889-3515
農林水産振興センター 北部: 0980-52-2752 宮古: 0980-72-2552 八重山: 0980-82-3497
- ③病害虫防除技術センター 本所: 098-886-3880 宮古: 0980-73-2634 八重山: 0980-82-4933