

定期予防接種スケジュール

H30年10月現在

★定期予防接種は、対象年齢や予防接種の間隔が定められています。（下記参照）かかりつけ医と相談し、計画的に受けましょう。

予防接種の種類	乳児期										幼児期						学童期												
	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳
ヒブ	←										←																		
小児用肺炎球菌	←										←																		
B型肝炎	←										←																		
四種混合※(DPT-IPV)	←										←																		
BCG(結核)	←										←																		
MR混合(麻しん・風しん)											I期						II期(小学校入学前の1年間)												
水痘											←																		
日本脳炎	←										←						←												
H7/4/2~H21/4/1生	特例対象者										←						←												
DT(二種混合)																	←												
子宮頸がん																	←												

※不活化ポリオ予防接種を受けている人は、引き続き不活化ポリオで接種して下さい。接種スケジュールは四種混合ワクチンと同様です。

定期予防接種の種類と対象年齢

種類	区分	接種対象年齢(標準接種年齢)		接種回数
四種混合(DPT-IPV)	1期初回	生後3か月~90か月未満	標準として3か月~(早めに)	20日~56日間隔で3回
	1期追加		標準として1期3回目終了後1年~1年半後	1回
BCG(結核)		生後5か月~1歳未満(5か月~8か月未満)		1回
MR混合(麻しん・風しん)	1期	12か月~24か月未満の児		1回
	2期	小学校入学前の1年間		1回
水痘	1回目	1歳~3歳未満	標準で生後12か月~生後15か月	2回
	2回目		1回目の接種から6~12か月の間隔をあけて接種。(最低3か月以上で接種可能)	
日本脳炎※	1期初回	6か月~7才半未満	標準として3才~4才までに	6日~28日間隔で2回
	1期追加		1期初回接種後おおむね1年後	1回
	2期	9才~13才未満	標準として9才	1回
ポリオ(小児マヒ)	1期初回	生後3か月~90か月未満	標準として3か月~(早めに)	20日~56日間隔で3回
	1期追加		標準として1期3回目終了後1年~1年半後	1回
DT(二種混合)	2期	11才~13才未満(四種混合またはDPT3回以上接種済みの児)		1回

※特例措置

- 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は20歳未満までの期間1期及び2期の未接種分を定期予防接種として受けることができます。
- 平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方は90か月未満までの間に1期分の3回接種が完了できなかった場合、未接種分を2期の対象年齢まで持ち越して定期予防接種として接種を受けることができます。

定期予防接種について

- 住所変更やその他の事由等で通知がなくても石垣市民であれば医療機関で接種できます。島外で接種する場合は、予防接種実施依頼書が必要になります。
- 対象年齢を過ぎた児へ接種を希望する場合は、任意接種となり全額負担になりますので早めに予防接種を受けましょう。

ヒブ・小児用肺炎球菌												
種類	区分	接種対象年齢及び接種回数※3:接種開始の月齢・年齢により回数が変わります。										
ヒブワクチン	1回目	2か月~6か月で接種開始	7か月~1才未満で接種開始※3	1才~4才児※3								
	2回目	4~8週間隔で3回接種	4~8週間隔で2回接種	1回接種のみ								
	3回目				2回目の7~13か月後							
	4回目		3回目の7~13か月後									
小児用肺炎球菌	1回目	2か月~6か月で接種開始	7か月~1才未満で接種開始※3	1才~2才未満で接種開始※3								
	2回目	27日間以上の間隔で3回接種	27日間以上の間隔で2回接種	60日以上の間隔で2回接種								
	3回目		60日以上の間隔	1回接種のみ								
	4回目				60日以上の間隔(標準として1才を過ぎ)							
B型肝炎	1回目	2か月~1歳未満	子宮頸がん									
	2回目	27日間以上の間隔で2回接種	小学6年生(12歳相当)~高校1年生(16歳相当)の女性									
	3回目		1回目の接種から139日以上の間隔	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ワクチン名(2種類あり)</th> <th>接種回数</th> <th>(間隔)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サーバリックス</td> <td>3回接種</td> <td>(2回目:1回目の1か月後に接種) (3回目:1回目の6か月後に接種)</td> </tr> <tr> <td>ガーダシル</td> <td>3回接種</td> <td>(2回目:1回目の2か月後に接種) (3回目:1回目の6か月後に接種)</td> </tr> </tbody> </table>		ワクチン名(2種類あり)	接種回数	(間隔)	サーバリックス	3回接種	(2回目:1回目の1か月後に接種) (3回目:1回目の6か月後に接種)	ガーダシル
ワクチン名(2種類あり)	接種回数	(間隔)										
サーバリックス	3回接種	(2回目:1回目の1か月後に接種) (3回目:1回目の6か月後に接種)										
ガーダシル	3回接種	(2回目:1回目の2か月後に接種) (3回目:1回目の6か月後に接種)										

次のことに注意して予防接種を受けましょう!

- 接種事故を防ぐためにも、体温は必ず医療機関で計ってください。
- 予防接種を受ける時は、保護者(祖父母でも可)の同伴がないと受けられません。
- 接種するときは、お子様の日頃の健康状態をできるだけ詳しく担当医に話し他の心配事も気軽に相談ください。

お問い合わせ：石垣市健康福祉センター

電話：0980-88-0088